

レジメン名: リブロファズ + CBDCA + peme療法 (2-4c、80kg以上)

静岡県立静岡がんセンター
2026年6月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	30分で	9:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	ペムレキセド点滴静注液	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	9:30		
	生理食塩液	30mL					
No.3	カルボプラチン注射液	AUC5	持続点滴末梢	1時間で	9:35		
	生理食塩液	250mL					
No.4	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で	10:35		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ	100mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:50		
No.6	リブロファズ配合皮下注	3360mg	皮下注射	5分で	10:55		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ペムレキセド点滴静注液	500mg/m ²	500mg/m ²
No.3	カルボプラチン注射液	AUC5	750mg
No.6	リブロファズ配合皮下注	3360mg	3360mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンピタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎