

レジメン名：リブロファズ＋CBDCA＋peme療法（2-4c、80kg未満）

静岡県立静岡がんセンター
2026年6月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患：非小細胞肺がん

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() |
|------|------------------------|----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| No.1 | デキサート注射液3.3mg/mL | 1mL | 持続点滴末梢 | 30分で | 9:00 | | |
| | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 50mL | | | | | |
| | アロカリス点滴静注235mg10mL | 10mL | | | | | |
| No.2 | ペムトレキセド点滴静注液 | 500mg/m ² | 持続点滴末梢 | 360mL/h | 9:30 | | |
| | 生理食塩液 | 30mL | | | | | |
| No.3 | カルボプラチン注射液 | AUC5 | 持続点滴末梢 | 1時間で | 9:35 | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | |
| No.4 | ファモチジン注射液20mg | 20mg | 持続点滴末梢 | 15分で | 10:35 | | |
| | ポララミン注5mg1mL | 5mg | | | | | |
| | アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ | 100mL | | | | | |
| No.5 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | 10:50 | | |
| No.6 | リブロファズ配合皮下注 | 2400mg | 皮下注射 | 5分で | 10:55 | | |

インターバル日数：21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|
| No.2 | ペムトレキセド点滴静注液 | 500mg/m ² | 500mg/m ² |
| No.3 | カルボプラチン注射液 | AUC5 | 750mg |
| No.6 | リブロファズ配合皮下注 | 2400mg | 2400mg |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|--|
| Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンピタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 |