

レジメン名：リブロファズ＋CBDCA＋peme療法（5c以降、80kg未満）

静岡県立静岡がんセンター
2026年6月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患：非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	9:15		
	生理食塩液	50mL					
No.2	ペムレキセド点滴静注液	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	9:30		
	生理食塩液	30mL					
No.3	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で	9:35		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ	100mL					
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	9:50		
No.5	リブロファズ配合皮下注	2400mg	皮下注射	5分で	9:55		

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ペムレキセド点滴静注液	500mg/m ²	500mg/m ²
No.5	リブロファズ配合皮下注	2400mg	2400mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸（パンビタン末 1g）1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎