

レジメン名 : D-FLOT(中心静脈)療法 (Day1)

静岡県立静岡がんセンター

2026年7月17日 改訂

消化器内科

対象疾患 : 胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	中心静脈	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	中心静脈	15分で	11:05		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	ドセタキセル点滴静注液	50mg/m ²	中心静脈	1時間で	11:20		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間で	12:20		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.7	レボホリナート点滴静注用	100mg/m ²	中心静脈	1時間で	12:20		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.8	フルオロウラシル注	2600mg/m ²	中心静脈	24時間で	14:20		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューサーポンプ(7.2mL/h)使用				
No.9	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数： 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
No.5	ドセタキセル点滴静注液	50mg/m ²	50mg/m ²
No.6	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.7	レボホリナート点滴静注用	100mg/m ²	100mg/m ²
No.8	フルオロウラシル注	2600mg/m ²	2600mg/m ²

備考
アプレピタント内服